

# GESTAÇÃO NAS MULHERES NOTIFICADAS POR TUBERCULOSE EM MANAUS DE 2009 A 2013

## RESUMO

**Objetivo:** Descrever a tuberculose segundo estado gravídico e o desfecho da gestação em mulheres de 10 a 49 anos notificadas no município de Manaus de 2009 a 2013. **Metodologia:** Tratou-se de um estudo descritivo do tipo transversal, com abordagem quantitativa e coleta retrospectiva de dados dos casos notificados de Tuberculose de todas as formas, em mulheres de 10 a 49 anos, no período de 2009 a 2013, no SINAN, com busca e coleta concomitante no sistema de informação de nascidos vivos (SINASC) e no sistema de informação de mortalidade (SIM), com uso de técnicas de estatística descritiva (frequência absoluta e relativa). **Resultados:** Das mulheres notificadas com TB no SINAN, 50 (1,76) eram gestantes. Considerando os dados, a gestante com tuberculose tem 2,4 vezes maior probabilidade de evoluir a óbito que uma mulher em idade fértil não gestante com tuberculose (OR=2,4;IC95%:1,01;5,76), e maior probabilidade de evoluir para uma situação de encerramento diferente da cura (OR=0,24;IC95%:0,13;0,42). **Conclusão:** As gestantes com tuberculose abandonaram mais o tratamento e tem menor porcentagem de cura comparadas as não gestantes. Houve uma expressiva porcentagem de subnotificação e a coinfeção tuberculose/aids é um importante fator associado a mortalidade da gestante. Isto requer um aprimoramento no rastreamento da gestação nas mulheres infectadas por tuberculose, bem como no rastreamento de doenças infecciosas na gestante, e melhoria nas ações de acompanhamento do tratamento. **Contribuições para a Enfermagem:** O adequado manejo no nível de atenção primário a saúde com atuação do(a) Enfermeiro(a) na equipe de saúde é imprescindível para melhor adesão das pacientes ao tratamento medicamentoso, com melhoras do prognóstico para mãe e feto, com redução da mortalidade e aumento dos casos de cura.

**Descritores:** Tuberculose, gravidez, complicações na gravidez.