

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL07 a 10 de Dezembro 2009
Centro de Convenções do Ceará
Fortaleza

Trabalho 2959 - 1/3

**ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM LINFOMA
DE BURKITT****SILVA, CAROLINA BRAGA DA¹**VERAS, LORENA PONTE.²NOGUEIRA, DINA GEISA RAFAEL³JÚNIOR, JOSÉ IRAN OLIVEIRA DAS CHAGAS⁴BENEVIDES, LAURA TEREZA V. A.⁵LUNA, GEISY LANNE MUNIZ⁶

Introdução: Os linfomas são cânceres (tumores malignos) do sistema linfático. Esse sistema transporta um tipo especializado de leucócitos denominados linfócitos através de uma rede de canais tubulares (vasos linfáticos) para todas as partes do corpo, inclusive a medula óssea. Os dois tipos principais de linfoma são o linfoma de *Hodgkin* e o linfoma *não-Hodgkin*. O linfoma de *Burkitt* é um linfoma *não-Hodgkin* de grau muito alto, o qual é originário de um linfócito B e que tende a se disseminar para áreas fora do sistema linfático, como a medula óssea, o sangue, o sistema nervoso central e líquido cefalorraquidiano. Embora o linfoma de *Burkitt* possa ocorrer em qualquer idade, ele é mais comum em crianças e adultos jovens, particularmente os do sexo masculino. O linfoma de *Burkitt* é definido pela organização mundial da saúde (OMS, 2001) como um linfoma altamente agressivo, apresentando-se freqüentemente em localização extranodal, ou raramente como leucemia aguda, constituídas por células de imunofenótipo B, monomórficas, de médio tamanho com citoplasmas basófilico, exibindo numerosas figuras de mitoses. É causado pelo vírus de *Epstein-Barr*, que causa a mononucleose infecciosa nos indivíduos que vivem nos Estados Unidos. No entanto, os indivíduos com linfoma de *Burkitt* não podem transmitir a doença a outros.

1 Acadêmica do 8º Semestre do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade de Fortaleza –UNIFOR.
Email:carolinabragasilva@hotmail.com

2 Acadêmica de Enfermagem. Universidade de Fortaleza.

3 Acadêmico de Enfermagem. Universidade de Fortaleza

4 Acadêmica de Enfermagem. Universidade de Fortaleza

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL07 a 10 de Dezembro 2009
Centro de Convenções do Ceará
Fortaleza**Trabalho 2959 - 2/3**

5 Enfermeira. Mestre em enfermagem neonatal pela Universidade Estadual do Ceará e Docente da Universidade de Fortaleza.

6 Enfermeira.mestre em Saúde Coletiva.Docente da Universidade de Fortaleza.

Ainda não está claro porque o mesmo vírus causa linfoma na África Central e mononucleose nos Estados Unidos. **Objetivo:** Aplicar a sistematização de assistência de enfermagem ao paciente com linfoma de Burkitt. **Metodologia:** Estudo descritivo em forma de estudo de caso, com abordagem qualitativa, desenvolvido em um hospital público infantil terciário no município de Fortaleza-CE, durante o mês de abril de 2009. Os dados foram coletados através do processo de enfermagem: observação, entrevista, realização de exame físico, consultas ao prontuário e exames. O estudo seguiu as orientações éticas estabelecidas pela resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde sobre os aspectos éticos da pesquisa em saúde envolvendo seres humanos. **Resultados/Discussão:** M.C.R, 16 anos, solteiro, deu entrada no referido hospital apresentando dor lombar intensa seguido de dificuldade deambulação, evolui com disfunção de esfíncteres paresia e anestesia em sela. Foi iniciada a radioterapia e quimioterapia melhorando o quadro da dor lombar, apresentava-se paraplégico e com insuficiência renal crônica sendo transferido para unidade de terapia intensiva, onde foi realizada a Sistematização da Assistência de Enfermagem. Mediante o estudo clínico, foram encontrados vários diagnósticos de enfermagem, sendo os mais relevantes: Risco para infecção relacionado às alterações no sistema imunológico e aos procedimentos invasivos; Nutrição alterada: menor que as necessidades corporais relacionada à náuseas e vômitos secundários ao tratamento, evidenciado por peso corporal diminuído; Conforto e lazer prejudicados relacionado à hospitalização prolongada e quimioterapia demorada e paraplegia, evidenciado por dor, náuseas, vômitos, agitação e choro. Dentre as Intervenções de Enfermagem elaboradas, têm-se: Instruir os familiares quanto aos riscos de infecção; Lavagem meticulosa das mãos; Instituir medidas de isolamento; Atentar para sinais e sintomas de infecção; Determinar suas preferências alimentares e ofertá-las, se possível. **Conclusão:** A elaboração de um plano de sistematização de enfermagem é de fundamental importância, pois auxilia na individualização do cuidado do paciente,

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL07 a 10 de Dezembro 2009
Centro de Convenções do Ceará
Fortaleza

Iracema Guardiã

**Trabalho 2959 - 3/3**

descrevendo qual cuidado ele deverá receber e como esse cuidado poderá ser melhor executado tornando a assistência de enfermagem personalizada, eficiente e eficaz, de qualidade e com segurança.

Referências Diagnóstico de enfermagem da NANDA: definições e classificação- 2007. (Org.) North American Nursing Diagnosis Association. Porto Alegre: Artmed 2007. GOLDMAN, AUSIELLO. **Tratado de Medicina Interna.** 22ª edição, Editora: Elsevier, 2005. JAMRA, M. **Leucócitos, Leucemias, Linfomas.** Editora: Rio de Janeiro, Guanabara koogan, 1983. SPENCE, ROY A. J. **Oncologia.** 5ª edição, Editora: Guanabara Koogan, 2001. GOLDENZWAIG, N. R. S. C. **Administração de medicamentos na enfermagem.** 6ª edição, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

Descritores: Linfoma de Burkitt, Assistência de Enfermagem, Linfoma.