

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL07 a 10 de Dezembro 2009
Centro de Convenções do Ceará
Fortaleza

Iracema Gardã



Trabalho 814 - 1/2

**MOTIVOS ALEGADOS PELOS PACIENTES COM TUBERCULOSE
PARA NÃO REALIZAÇÃO DA SOROLOGIA HIV.****Monte, Raquel Santos¹****Silva, Helder Oliveira²****Gonçalves, Marcelo Luiz Carvalho³**

O surgimento da infecção pelo HIV modificou a epidemiologia da tuberculose no mundo e dificultou ainda mais o seu controle. O Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) orienta que todos os pacientes com diagnóstico dessa micobacteriose realizem a testagem sorológica para o HIV. O presente estudo objetivou investigar os motivos alegados pelos pacientes com tuberculose para não realização da testagem sorológica para o HIV. Trata-se de um estudo transversal e descritivo, com abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 30 pacientes com diagnóstico confirmado de tuberculose que não realizaram a sorologia anti-HIV no período de tratamento. A coleta de dados foi realizada entre os meses de março e junho de 2009, em 14 Centros de Saúde da Família (CSF) do município de Fortaleza-CE. Os resultados apontam que 20(66,6%) dos entrevistados eram do sexo masculino, 12(40%) tinham renda familiar inferior a um salário mínimo, 25(83,3%) possuíam menos de oito anos de estudo e 23(76,7%) estavam fazendo tratamento para tuberculose pela primeira vez. A média de idade dos pacientes foi de 41,5 anos ($\pm 18,1$), variando entre 15 anos e 77 anos. Em relação aos motivos para não realização da sorologia anti- HIV, 14(46,7%) afirmaram que receberam a solicitação, mas não foram realizar o exame; 09(30%) informaram que o profissional de saúde não solicitou a sorologia; 06(20%) recusaram-se a realizar a testagem e 01(3,3%) alegou que realizou o procedimento, mas seu exame foi extraviado. Evidenciam-se entraves para a realização do exame anti-HIV, entre eles, rejeição do paciente, ausência de solicitação da sorologia por parte de alguns profissionais de saúde, dificuldade de coleta do material, demora no recebimento do resultado e extravio de exames. Tornam-se necessários ajustes operacionais nos serviços de saúde, treinamento dos profissionais em aconselhamento pré e pós-testagem e a sensibilização dos

1. Enfermeira, Especialista em Enfermagem Obstétrica, Enfermeira do PSF, Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, kelmonte@bol.com.br.
2. Enfermeiro, Discente do Mestrado em Saúde Coletiva da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Enfermeiro do PSF, Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza.
3. Médico. Doutor em Saúde Pública pela ENSP/FIOCRUZ. Docente do Mestrado em Saúde Coletiva da Universidade de Fortaleza (UNIFOR);

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

07 a 10 de Dezembro 2009
Centro de Convenções do Ceará
Fortaleza



Trabalho 814 - 2/2

pacientes, através de ações educativas, sobre a importância de realizar a sorologia anti-HIV em todos os portadores de tuberculose.

Palavras-chave : Tuberculose, Sorodiagnóstico de HIV, Epidemiologia.

1. Enfermeira, Especialista em Enfermagem Obstétrica, Enfermeira do PSF, Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, kelmonte@bol.com.br.
2. Enfermeiro, Discente do Mestrado em Saúde Coletiva da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Enfermeiro do PSF, Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza.
3. Médico. Doutor em Saúde Pública pela ENSP/FIOCRUZ. Docente do Mestrado em Saúde Coletiva da Universidade de Fortaleza (UNIFOR);