Trabalho 983

PREVALÊNCIA DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM RESPIRATÓRIOS EM CRIANÇAS COM INFECÇÃO RESPIRATÓRIA AGUDA

Michelle Helcias Montoril¹, Vanessa Emille Carvalho de Sousa², Lívia Maia Pascoal³, Marcos Venícios de Oliveira Lopes⁴, Viviane Martins da Silva⁵.

INTRODUÇÃO: A temática das tecnologias em saúde encontra-se atualmente em foco nas pesquisas e, inserida nesta temática, está o tema dos diagnósticos de enfermagem. O desenvolvimento de pesquisas direcionadas a um aprimoramento da taxonomia diagnóstica e à aplicabilidade de tal tecnologia em diferentes cenários de atuação da enfermagem é uma resposta à necessidade que temos de melhorar a qualidade da assistência prestada pela equipe de enfermagem e embasar cientificamente o cuidado ao paciente⁽¹⁾. Os diagnósticos de enfermagem Troca de gases prejudicada (TGP), Desobstrução ineficaz das vias aéreas (DIVA) e Padrão respiratório ineficaz (PRI) têm sido apontados na literatura como fenômenos com elevada prevalência em diferentes situações e grupos etários⁽²⁾. As infecções respiratórias agudas (IRA) são doenças comuns na infância que ocasionam alterações que repercutem de forma negativa na funcionalidade do sistema respiratório. Sendo assim, estas alterações contribuem para o aparecimento de sinais e sintomas característicos dos diagnósticos de enfermagem respiratórios. Estudos de prevalência são importantes, pois permitem avaliar a situação de saúde de indivíduos, nortear decisões terapêuticas e alertar os profissionais de enfermagem a respeito das principais necessidades do paciente. **OBJETIVO:** Identificar a prevalência dos diagnósticos de enfermagem DIVA, PRI e TGP e de suas características definidoras em crianças com IRA. **DESCRIÇÃO METODOLÓGICA:** Este estudo foi extraído de uma avaliação longitudinal, do tipo coorte prospectiva aberta, de crianças com IRA, avaliadas por um período de seguimento de 6 a 10 dias, sendo que na presente investigação consideraram-se somente os dados referentes ao primeiro dia de avaliação. Sendo assim, identificou-se a prevalência dos três diagnósticos de enfermagem em questão de forma transversal. O estudo foi realizado em dois hospitais públicos da cidade de Fortaleza - Ceará, especializados no atendimento à criança. Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: idade de 0 a 5 anos, período de admissão no hospital de no máximo 48 horas e diagnóstico de IRA. Como critério de exclusão atribuiu-se a existência de doenças crônicas. A amostra final foi constituída por 136 crianças, número obtido por meio da aplicação de uma fórmula específica para o cálculo do tamanho amostral. O instrumento de coleta de dados foi elaborado com vistas a permitir a identificação das características definidoras dos diagnósticos PRI, DIVA e TGP, conforme taxonomia da NANDA-I⁽³⁾, logo, foram abordados principalmente dados semiológicos dos pulmões e do tórax. O procedimento de coleta de dados foi realizado pela pesquisadora principal em conjunto com um aluno de mestrado e

1 Enfermeira, Especialista, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil. E-mail:michelle_helcias@yahoo.com.br

2 Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil.

3 Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Professora Assistente I da Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão, Brasil.

4 Enfermeiro, Doutor em Enfermagem, Professor associado I da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil.

5 Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Professora Adjunto da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil.

Trabalho 983

quatro acadêmicos de enfermagem da Universidade Federal do Ceará. O processo de inferência diagnóstica foi realizado por 10 enfermeiros considerados especialistas após capacitação e avaliação da sua habilidade em inferir corretamente os diagnósticos de enfermagem respiratórios. A ocorrência ou não do diagnóstico foi determinada pela concordância absoluta entre os diagnosticadores. Para a análise dos dados, foi utilizada a estatística descritiva e inferencial com auxílio do software SPSS versão 19.0 for Windows. Para a análise descritiva, foram consideradas as frequências absolutas, percentuais e medidas de tendência central e de dispersão. Aplicou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificação de normalidade dos dados numéricos. Para análise da associação entre as variáveis categóricas, foram aplicados o Teste Qui-quadrado de Pearson. O teste exato de Fisher foi aplicado quando as frequências esperadas das variáveis categóricas foram menores que cinco. Na presente abordagem, realizou-se análise descritiva de prevalências e verificação de associações por meio do cálculo da razão de chances, também denominada Odds Ratio (OR). O projeto de pesquisa que deu origem ao presente estudo foi encaminhado a um Comitê de Ética e recebeu aprovação mediante o protocolo nº 057-2010. Além disso, foi solicitada a anuência dos pais das crianças avaliada mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. **RESULTADOS:** A idade das crianças teve uma mediana de 16,1 meses. Quanto ao gênero, 58,1% da amostra pertenciam ao masculino. Os diagnósticos médicos mais prevalentes foram pneumonia (85,3%) e asma (18,4%). Quanto aos diagnósticos de enfermagem, o mais prevalente foi DIVA (91,9%), seguido por PRI (64,0%) e por TGP (42,6%). As características definidoras mais prevalentes foram: Tosse ineficaz (91%), Ruídos adventícios respiratórios (80,1%), Respiração anormal (79,4%), Alteração na profundidade respiratória (77,9%), Dispneia (75%), Taquipneia (63,2%) e Hipoxemia (41,2%). Ao se considerar o nível de significância estatística ($p < 0,05$), o diagnóstico DIVA apresentou associação com 6 características: Mudança na frequência respiratória (OR=2,88), Olhos arregalados (OR=68,73), Ruídos respiratórios adventícios (OR=300,58), Sons respiratórios diminuídos (OR=9,00), Tosse ineficaz (OR=129,53) e Vocalização dificultada (OR=10,04). O diagnóstico PRI mostrou associação significativa com Alteração na profundidade respiratória (OR=73,32), Diâmetro antero-posterior aumentado (OR=31,56), Excursão torácica alterada (OR=259,14), Ortopneia (OR=30,14), Taquipneia (OR=5,89) e Uso de musculatura acessória para respirar (OR= 2595,06). Por sua vez, o diagnóstico TGP esteve associado com as características Agitação (OR = 11,37), Cianose (OR = 87,83), Cor da pele anormal (OR = 10,06), Hipoxemia (OR = 11642,1) e Respiração anormal (OR = 6,26). Estes resultados indicam que a presença das características definidoras que mostraram associação estatística se relaciona a um aumento na chance de ocorrência dos diagnósticos de enfermagem estudados, em crianças com IRA. **CONCLUSÃO:** Este estudo possibilitou identificar a prevalência das características definidoras e dos diagnósticos de enfermagem DIVA, PRI e TGP assim como verificar associações entre estes elementos em crianças com infecção respiratória aguda. Faz-se necessário desenvolver estudos semelhantes com diferentes perfis de pacientes, pois esse tipo de abordagem pode fornecer informações que auxiliem o enfermeiro na identificação dos diagnósticos, no planejamento e execução dos cuidados de enfermagem. **CONTRIBUIÇÕES OU IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM:** Conhecer a prevalência das características definidoras e dos diagnósticos de enfermagem respiratórios em populações específicas, como em crianças com IRA, pode auxiliar a decisão diagnóstica executada pelo enfermeiro, pois além de favorecer o conhecimento do perfil apresentado por crianças nessa situação clínica contribui para um melhor raciocínio diagnóstico. **REFERÊNCIAS:** 1. Nietzsche EA. Tecnologia emancipatória: possibilidade ou impossibilidade para a práxis de enfermagem. Ijuí: Unijuí; 2000. 2. Faria MFG. Diagnósticos de enfermagem respiratórios em pacientes cardíacos cirúrgicos. Dissertação (Mestrado em Enfermagem Fundamental), Universidade de São Paulo, 2000. 3. Herdman TH (ed.). NANDA International. Nursing diagnosis: definitions

65º CBEn
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM

A ENFERMAGEM E O CUIDADO COM A VIDA

07 A 10 DE OUTUBRO DE 2013
CENTRO DE CONVENÇÕES SULAMÉRICA
RIO DE JANEIRO/RJ

Trabalho 983

and classification 2009-2011. Oxford: Wiley-Blackwell; 2009. DESCRITORES: diagnóstico de enfermagem, enfermagem baseada em evidências, infecção respiratória aguda.