



Trabalho 1200

RESULTADOS PRELIMINARES: QUALIDADE DE VIDA DE PORTADORES DE BEXIGA NEUROGÊNICA USUÁRIOS DE CATETERISMO URINÁRIO INTERMITENTE

Autores: Laís Fumincelli, Alessandra Mazzo, Dayane Rosa Alvarenga Santos, Aline Nassuf, Rachel Cristina Rodrigues dos Santos, Valtuir Duarte de Souza Júnior

O cateterismo urinário intermitente, uma das principais alternativas de tratamento para bexiga neurogênica, pode acarretar mudanças na vida de pacientes e/ou cuidadores, afetando sua Qualidade de Vida (QV). Este estudo tem como objetivos, caracterizar os usuários de cateterismo urinário intermitente portadores de bexiga neurogênica em processo de reabilitação e mensurar a QV desses pacientes. Estudo descritivo, transversal, realizado em um hospital universitário do interior paulista, Brasil. Seguindo os preceitos éticos, a coleta de dados foi realizada por meio de dois instrumentos, um questionário de dados sociodemográficos e clínicos e um instrumento de avaliação de QV, WHOQOL-bref. Foram entrevistados os pacientes com bexiga neurogênica (20-100,0%), maiores de 18 anos, usuários de cateterismo urinário intermitente, do Ambulatório de Urologia no Centro de Reabilitação, no período de fevereiro a maio de 2013. Dentre os 20 (100,0%) pacientes, 13 (65,0%) eram homens e 7 (35,0%) mulheres, sendo a maioria solteiro e com idade média de 41,5 anos. Sobre o cateter, 16 (80,0%) utilizam sonda de polietileno e 4 (20,0%) de vidro. Na realização do autocateterismo, 14 (70,0%) fazem cateterismo sozinho e 6 (30,0%) pelo cuidador. Quanto a avaliação da QV, os domínios físico e meio ambiente refletiram os piores escores e os bem avaliados estavam psicológico e relações sociais. A avaliação da QV dos pacientes amplia as decisões da equipe de saúde e ocasiona mudanças nas políticas assistenciais e nos métodos de tratamento, melhorando a compreensão da escolha terapêutica.

Referências:

- ACHTERBERG TV, HOLLEMAN G, COBUSSEN-BOEKHORST H, ARTS R, HEESAKKERS J. Adherence to clean intermittent self-catheterization procedures: determinants explored. J Clin Nurs. 2008 Feb;17(3):394-402.
- FLECK, M.P.A. et al. Aplicação da versão em português do instrumento abreviado de avaliação da qualidade de vida "WHOQOL-bref". Rev. Saúde Pública. 2000; 34(2):178-83.

Descritores: qualidade de vida; cateterismo uretral intermitente; enfermagem.

Eixo II: Interfaces da Enfermagem com práticas profissionais e populares de cuidado em saúde

Laís Fumincelli. Enfermeira, mestranda do Programa Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP). E-mail: lais.fumincelli@usp.br. Alessandra Mazzo. Professora Doutora do Departamento de Enfermagem Geral e Especializada da EERP-USP, Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde para o desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem e Obstetrícia. Dayane Rosa Alvarenga Santos. Aluna de Graduação em Enfermagem da EERP-USP. Aline Nassuf. Aluna de Graduação em Enfermagem da EERP-USP. Rachel Cristina Rodrigues dos Santos. Enfermeira, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Valtuir Duarte de Souza Júnior. Enfermeiro, mestrando do Programa Enfermagem Fundamental da EERP-USP.