

: CONSTRUÇÃO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

SANTANA, Rosimere Ferreira¹

_BITENCOURT, Grazielle Ribeiro²

(Fundamentação): T -

resultado de enfer

Enfermagem (NOC) - . A

relaciona-se a identificação do

Eliminação Urinária Prejudicada (NANDA-I), este direciona a (NIC),

que de forma prevista conduzira aos resultados esperado.

, faz- o avaliação dos resultados

resultados esperados, ou seja, descri

sentimentos do paciente, em resposta ao cuidado prestado. Cada resultado proposto

pela NOC

partir do estado atual do

paciente,

, ao longo do tempo. :

- ?

1 a 5, mas ausente de de

. E -

. Idealmente deve ser

validado cientificamente basea

ncia).

O

¹ Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Especialista em Psicogeriatria. Professora Adjunta MEM/EEAAC/UFF. Vice-coordenadora da Pós-Graduação em Enfermagem Gerontológica (EEAAC/UFF). Líder do NEPEG. Líder do GESAE_UFF. rosifesa@gmail.com

² Enfermeira. Mestre em Ciências do Cuidado em Saúde. Professora substituta MEM/EEAAC/UFF. Membro do Grupo de Estudos em Sistematização da Assistência de Enfermagem (GESAE_UFF) e Núcleo de Estudos e Pesquisa em Enfermagem Gerontológica (NEPEG). E-mail: gra_uff@yahoo.com.br

1

idoso com elimin

MÉTODOLÓGICA: Para tanto adotaram-se 2 fases, a

: Q

enfermagem no
DESCRIBÇÃO
? Tendo como
; Enfermagem perioperat
enfermagem os artigos presentes nas bases de dados CINAHL, LILACS, SCOPUS E
MEDLINE publicados entre os anos de 2002 a 2011 e

RESULTADOS:

. A fita rea

; 56(54,4%)

avaliadores foi maior no esvaziamento completo da bexiga (0,928)

ncia. Observa-se ainda que quanto mais velhos os
idosos pior o esvaziamento completo da bexiga (-0,241), e a ard ncia ao urinar (-
0,196). : Teve-se na literatura

, sangue na urina, dor ao

ur

-
ncia para a melhor compreens . , pontua-
se o

dos indicadores citados.

. Dentre
eles, o que contribuiu com a maior parte dos indicadores foi a fita reigente. Esta pode

preco . -
. Na
parte clinica, obteve-se que q -

-
nio, pro -
. Do
mesmo modo, a especialidade cirurgia geral indicou piora no -

, mas as complicações
cirúrgicas foram significativas. **CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM:** Os

,
portanto, uso em ensaios clínicos. Como também, incentiva
para os resultados de enfermagem NOC de modo a monitorar a melhora, piora ou
est te.

Descritores: ; Idoso;
enfermagem

REFERENCIAS:

MOORHEAD, S. The nursing outcomes classification. Rev. Acta Paul. v.22, n.1, p. 868-71, 2009.

MAAS M. Evaluation of the reliability and validity of nursing outcomes classification patient outcomes and measures. J Nurs Manag.v.11, n.2, p.97-117, 2003

DONABEDIAN A. Basic approaches to assessment: structure, process and outcome. In: DONABEDIAN A. Explorations in Quality Assessment and Monitoring. Michingan (USa): Health Administration Press; 1980. p. 77-125.

Lopes MVO, Araújo TL & Silva VM (2012) Methods for establishing the accuracy of clinical indicators in predicting nursing diagnoses. International Journal of Nursing Knowledge 23, 3.